

دراسة إشعاعية سيفالومترية للمركب الوجهي للأولاد ال سعوديين في كل من المناطقين الوسطى والغربية

زهير أمين مرشد

كلية طب الأسنان ، جامعة الملك عبد العزيز

جدة - المملكة العربية السعودية

المستخلص. أوضحت الدراسات السابقة لقياسات الشكلية للمركب الوجهي على عينة طبيعية من الأولاد السعوديين فروقات واضحة في كل من المنطقتين الغربية والوسطى.

والغرض من هذه الدراسة هو إجراء مقارنة بين بعض تلك القياسات في فئة عمرية عند إعداد الخطة العلاجية للمريض.

تم اختيار وقياس خمس وثلاثين صورة إشعاعية لمنطقة الوسطى، وأربعين صورة إشعاعية لمنطقة الغربية، تتراوح أعمارهم بين ١٠-١٢ سنة من ذوي الإطباق السنوي والعظمي الأول. أظهرت نتيجة الدراسة أن الفك السفلي أكثر انحداراً، بالإضافة إلى رجوع في ميلان القواطع الأمامية في أولاد المنطقة الغربية، مقارنة بأولاد المنطقة الوسطى.

دلت الدراسة أيضاً على أن المركب الوجهي الوجهى للأولاد السعوديين بالمنطقة الغربية والوسطى متشابهان تقريباً، عدا تميز أولاد المنطقة الغربية بزيادة زاوية انحدار الفك السفلي، وميلان أقل للقواطع الأمامية عن نظائرهم في المنطقة الوسطى.